

**Ukąsił Cię kleszcz ? Nie czekaj na pierwsze objawy!**

**Zbadaj w naszym laboratorium kleszcza w kierunku  
BORELIOZY !**



Ze względu na fakt, że diagnostyka i terapia boreliozy mogą być często bardzo skomplikowanym procesem (objawy kliniczne występują często dopiero po kilku miesiącach po ukąszeniu kleszcza) **diagnostyka przeprowadzona we wczesnym etapie jest wyjątkowo rozsądnym rozwiązaniem.**

**Dlatego nasze laboratorium oferuje Państwu  
zbadanie kleszcza w kierunku boreliozy.**

**Dzięki użyciu testu *FASTest*® BOR in TICK potencjalnie obecne w kleszczu antygeny *Borrelia* można wykryć szybko, w prosty i niezawodny sposób, a w przypadku pozytywnego wyniku podjąć od razu po ukąszeniu kleszcza odpowiednie procedury diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne.**

# Jak dostarczyć kleszcza do badań ?

## 1. Usunąć bezpiecznie kleszcza ze skóry

Po ukąszeniu, kleszcza najlepiej usuwać pęsetą, lassem do usuwania kleszczy lub innymi przyrządami służącymi do tego celu. Nie należy usuwać kleszcza gołymi rękami, gdyż może zwiększyć to ryzyko zakażenia. Należy chwycić kleszcza jak najbliżej skóry i pewnym, ale delikatnym ruchem wyciągnąć go pociągając ku górze. Nie należy kleszcza wykręcać, a także nie wolno zaciskać pęsety na ciele kleszcza. Po wyjęciu kleszcza należy ranę oraz pęsetę zdezynfekować środkiem dezynfekującym rany oraz dokładnie oczyścić ręce wodą z mydłem.



**Uwaga! Nie wolno smarować kleszcza masłem lub innymi środkami, które mogłyby go podrażnić, gdyż znacznie zwiększa to ryzyko zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.**

## 2. Dostarczenie kleszcza do naszego laboratorium

Kleszcza należy zapakować w miarę możliwości szczelnie do woreczka foliowego albo pojemnika na mocz lub kał następnie dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 48 godzin od usunięcia kleszcza. W czasie przed dostarczeniem do laboratorium przechowywać w lodówce.